Karte 6_2

Vulnerabilitätsanalyse Westsachsen

Bearbeitungsstand März 2011

Standörtliche Vulnerabilität gegenüber Trockenphasen I



Vulnerabilität waldbaulich genutzter Standorte gegenüber Trockenphasen

- sehr hohe Vulnerabilität
- hohe Vulnerabilität
- mäßige Vulnerabilität
- geringe Vulnerabilität

Grundlage: Wasserspeichervermögen (nutzbare Feldkapazität x Hangneigung), Grundwasserflurabstand, Klimaräume Westsachsen

Klimatische Veränderung in Westsachsen

Klimaraum / Charakteristika	Raum 1 Tiefstlagen	Raum 2 Tieflagen	Raum 3 Übergangslagen	Raum 4 Hügelland
Temperaturhöhe				
Niederschlagsrückgang				
Negativität Wasserbilanz				
Temperaturänderung	↑	↑	↑	↑
	1	2	3	4

Regionsgrenze

Grenze Klimaräume

zentrale Orte

Quellen:
LfULG: Bodenkarte 50; 2009.
LfUG: Biotoptypen- und Landnutzungskartierung; 2005.

KLIMA MORO

LEIPZIG – WESTSACHSEN Regionaler Planungsverband

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN