Karte 6_4

Vulnerabilitätsanalyse Westsachsen

Bearbeitungsstand März 2011

Vulnerabilität von Wäldern gegenüber Trockenphasen



Vulnerabilität trockenheitsempfindlicher Baumarten (Fichte, Buche)

Grundlage: naturräumliche Sensitivität gegenüber Trockenphasen, Hauptbaumartenverteilung

- hohe und sehr hohe Vulnerabilität
- mittlere Vulnerabilität
- sonstige Wälder

Klimatische Veränderung in Westsachsen

Klimaraum / Charakteristika	Raum 1 Tiefstlagen	Raum 2 Tieflagen	Raum 3 Übergangslagen	Raum 4 Hügelland
Temperaturhöhe	▬	▬	▬	▬
Niederschlagsrückgang	▬	▬	▬	▬
Negativität Wasserbilanz	▬	▬	▬	▬
Temperaturänderung	↑	↑	↑	↑
	1	2	3	4

- Regionsgrenze
- Grenze Klimaräume
- zentrale Orte

Quellen:
LfULG: Bodenkarte 50; 2009.
LfUG: Biotoptypen- und Landnutzungskartierung; 2005.

KLIMA MORO | LEIPZIG – WESTSACHSEN Regionaler Planungsverband | TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN